S32.2X fracture du coccyx

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S322

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	695	540
dont cas avec diagnostic isolé	424	424

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	41.7	40.8
Age médian	41.55	41.0
Proportion des accidents professionnels	19%	19%
part des femmes	59%	59%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	5566	1100
Médiane des prestations	559	454
10% des cas ont des prestations inférieures à	89	66
10% des cas ont des prestations supérieures à	3508	2275
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	88%	55%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	13552	3829
Médiane des prestations	1945	1657
10% des cas ont des prestations inférieures à	187	160
10% des cas ont des prestations supérieures à	20267	10678
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	81%	53%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	455	320
Part de cas avec indemnité journalière	65%	59%
Médiane des prestations	54	33
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	35	20
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	12	7

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	0.3%	0.0%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	0.2%	0.0%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	49%	0%
Somme des degrés d´invalidité par année	108%	0%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 210 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S32.2X
en 2016-2020, dont 136 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S32.2X fracture du coccyx

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S322

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,4 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 0.0% des cas, dont 0.0% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.