S32.XX fracture du rachis lombaire et du bassin

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S32

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	5501	3199
dont cas avec diagnostic isolé	1024	1024

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	45.5	45.2
Age médian	47.63	47.36
Proportion des accidents professionnels	20%	21%
part des femmes	41%	45%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	34455	11007
Médiane des prestations	7478	3299
10% des cas ont des prestations inférieures à	380	273
10% des cas ont des prestations supérieures à	80084	28063
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	66%	55%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	88379	27100
Médiane des prestations	17757	11028
10% des cas ont des prestations inférieures à	1282	763
10% des cas ont des prestations supérieures à	166308	57360
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	73%	56%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	4768	2635
Part de cas avec indemnité journalière	87%	82%
Médiane des prestations	171	102
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	148	84
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	63	45

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	29	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	225	34
Part de cas avec IR	4.1%	1.1%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	1.7%	0.2%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	42%	22%
Somme des degrés d´invalidité par année	9542%	763%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	11%	5%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 4519 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S32.XX
en 2016-2020, dont 1520 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S32.XX fracture du rachis lombaire et du bassin

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S32

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,29 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 1.0% des cas, dont 0.9% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.