S54.0_ lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Extrapolation du nombre de cas par année	113	87
dont cas avec diagnostic isolé	8	8

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Age moyen	37.7	37.0
Age médian	31.34	30.06
Proportion des accidents professionnels	46%	49%
part des femmes	30%	33%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	17337	8562
Médiane des prestations	6432	3492
10% des cas ont des prestations inférieures à	588	682
10% des cas ont des prestations supérieures à	34138	29229
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	55%	22%

Total des prestations d´assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Moyenne des prestations	58665	22173
Médiane des prestations	15189	9150
10% des cas ont des prestations inférieures à	970	846
10% des cas ont des prestations supérieures à	147646	48243
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	47%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	89	63
Part de cas avec indemnité journalière	79%	73%
Médiane des prestations	220	92
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	173	67
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	49	39

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	0
Part de cas avec IR	3.2%	0.2%
Degré d´invalidité moyen (tous les cas)	0.9%	0.3%
Degré d´invalidité moyen (cas avec IR)	29%	112%
Somme des degrés d´invalidité par année	106%	22%
Cas avec indemnités pour atteinte à l´intégrité	11%	4%

Extrapolation sur la base d´un échantillon de 91 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S54.0_
en 2016-2020, dont 38 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal
Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

S54.0_ lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras

Répartition des frais de traitement et des prestations d´assurance (2)



Jours indemnisés jusqu´à la reprise du travail ou la fixation d´une rente (2)



Exemple de lecture:
Après trois mois,23 % des accidentés ne sont pas encore aptes au travail.
Une rente a été allouée pour 0.0% des cas, dont 0.0% de rentes invalidité et 0.0% des cas de décès.